

Détruisez l'Ambroisie avant qu'elle ne soit en fleurs

Pourquoi ?

Les pollens d'Ambroisie

peuvent provoquer des réactions allergiques

en fin d'été :

- rhinites
- conjonctivites
- asthme
- laryngites
- urticaire
- eczéma



L'AMBROISIE AVANT FLORAISON

L'Ambroisie pousse :

- sur les remblais et chantiers.
- les terres à l'abandon.
 - les lotissements.
 - dans les cultures.

Ses fleurs sont
vert pâle à jaune
et se dressent en épis



Sa hauteur varie
de 0,20 m à 2,00 m

Ses feuilles sont
très découpées,
minces,
vertes des 2 côtés

Ses tiges sont dressées
sillonnées en longueur
souvent velues
et ramifiées

AMBROISIE EN FLEUR

Agissez !

La plante doit être **éliminée**

- par l'arrachage (avec port de gants).
- par un fauchage (à 10 cm),
de préférence avant floraison,
fin juillet répété fin août.
- en empêchant son installation par végétalisation
avec des plantes non allergisantes
(trèfle, luzerne, ...).

Informez-vous !

www.ambrosie.info

www.pollen.fr

Reconnaissez-la

**Ne la confondez pas
avec
l'armoise vulgaire !**



Observatoire des ambroisies, d'après DDAS Rhône



ARMOISE VULGAIRE EN FLEUR



Contact: observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr

	Ambroisie	Armoise
TIGE	Striée Couleur verte et aubergine Couverte de poils blancs Assez souple	Striée Couleur verte et aubergine Pas de poils Raide
FEUILLE	<i>Couleur :</i> les deux faces : vert clair <i>Forme :</i> profondément divisée jusqu'à la nervure	<i>Couleur :</i> • face supérieure vert foncé • face inférieure : blanchâtre <i>Forme :</i> divisée mais aller jusqu'à la nervure
FLEUR	Grappes de petites fleurs situées au sommet des tiges, couleur vert-jaune avant éclosion, jaune après éclosion Très pollinisante	Grappes de petites fleurs, à la base des feuilles de fin de tige, couleur vert- gris avant éclosion, blanche après éclosion Faiblement pollinisante
		
	FEUILLE D'AMBROISIE	FEUILLE D'ARMOISE

Ambroisie
attention
Allergies !



AMBROISIE A FEUILLES D'ARMOISE

Tous concernés
Chacun doit agir !